

Importancia del diagnóstico en el tratamiento de una úlcera venosa

INTRODUCCIÓN

Paciente de 82 años con diagnóstico de osteoporosis, enfermedad cardíaca hipertensiva, HTA, Diabetes, Insuficiencia Venosa
Presenta úlcera vascular en MID de 7 meses de evolución

OBJETIVO

Cicatrizarse la herida mediante el tratamiento etiológico y en el menor tiempo posible

METODOLOGÍA

Tras finalizar tratamiento antibiótico iniciamos curas con Urgostart Plus más apósito secundario en días alternos con vendaje elástico. En la tercera cura se realiza ITB (1,44) y se decide aplicar Urgo k2 lite (terapia compresiva multicomponente de 20mmHg). Dos curas después el edema ha desaparecido y la lesión ha mejorado de forma muy evidente. En este momento se cambia la pauta de curas a dos veces por semana.

RESULTADOS

La paciente no ha vuelto a requerir tratamiento antibiótico, el dolor ha disminuido considerablemente y la lesión se cierra por completo a mediados de enero.

CONCLUSIONES

El diagnóstico decide el tratamiento etiológico de las úlceras venosas. La terapia compresiva es decisiva y deben aunarse esfuerzos para establecerla como pauta habitual en este tipo de heridas. Además las úlceras venosas son heridas crónicas que presentan un exceso de metaloproteinasas y su tratamiento puede beneficiarse mucho de la inhibición de estas enzimas.

AUTORAS

Engracia Mosquera Bustabad
Isabel María Muñoz Fernández
Centro de Salud Mentidero
Cádiz

D 1



D 7



D15



D25



D 60

